

Aglianico Nero

I-CRSA-Regione Puglia D382

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	nella media varietale
Oidio	nella media varietale

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	tardivo
Fioritura	tardiva
Invaiatura	tardiva
Maturazione	tardiva

COSTITUTORE

C.R.S.F.A. "Basile Caramia"
IPSP-CNR – Sez. di Bari
Università degli studi di Bari
Regione Puglia – Assessorato Agricoltura

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino molto intenso, con ottimi riflessi violacei, profumi tipici della cultivar. Prevalgono le note vegetali balsamiche e quelle floreali, mentre non mancano i sentori di frutta matura. L'equilibrio complessivo è ottimo, grazie alla buona tannicità e al buon contenuto acidico. La persistenza gusto-olfattiva è elevata. Il vino risulta adatto all'invecchiamento medio-lungo.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	di forma cilindrico-conica, medio-lungo, mediamente compatto
Fertilità	nella media
Produttività	nella media
Vigoria	nella media
Acino	arrotondato, di colore blu nero uniforme; polpa succoso-carnosa e buccia di consistenza molle-tenera

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,8
Produzione per ceppo (kg)	6,3
Numero grappoli/ceppo	20
Peso medio grappolo (g)	318
Peso medio acino (g)	2,0
Peso legno potatura (kg/ceppo)	1,20
Indice di Ravaz	5,25

Aglianico Nero

I-Cra VIC BC SF 3

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,66
Oidio	1,33

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	1° decade aprile
Fioritura	1° decade giugno
Invaiatura	2° decade agosto
Maturazione	2° decade settembre

COSTITUTORE

CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura, Arezzo
 Consorzio Italiano Vivaisti Viticoli, AMPELOS
 Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla
 Azienda Agricola Vivai Signorini Franco

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino con intensi riflessi violacei; l'aroma è caratteristico, intenso e persistente, con sentori di viola, rosa, frutti di bosco, spezie. Al sapore si presenta morbido e vellutato, con buon corpo e moderata acidità, armonico.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	piramidale, alato, con peduncolo legnoso
Fertilità	media
Produttività	contenuta
Vigoria	media
Acino	medio, di forma discoide, uniforme; buccia spessa e consistente, di colore blu/nero uniforme

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,48
Produzione per ceppo (kg)	2,43
Numero grappoli/ceppo	11,5
Peso medio grappolo (g)	211
Peso medio acino (g)	1,89
Peso legno potatura (kg/ceppo)	890
Indice di Ravaz	2,73