

# Cabernet Franc Nero

I-ISV Conegliano 1

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso; profumo caratteristico, molto marcato. Sapore tipico, erbaceo; buon corpo e discreto tenore alcolico. Il vino per la sua notevole struttura, ricchezza in antociani e alcolicità, si presta molto bene per l'invecchiamento.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio, piramidale, alato, mediamente spargolo
<b>Fertilità</b>	media
<b>Produttività</b>	inferiore alla media
<b>Vigoria</b>	un po' più tardivo degli altri biotipi omologati
<b>Acino</b>	medio, rotondeggiante

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	nella media varietale
<b>Oidio</b>	nella media varietale

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	3° decade aprile
<b>Fioritura</b>	1° decade giugno
<b>Invaiaura</b>	2° decade agosto
<b>Maturazione</b>	1° decade ottobre

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,58
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	9,10
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	-
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	115,90
<b>Peso medio acino (g)</b>	-
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	-
<b>Indice di Ravaz</b>	-

# Cabernet Franc Nero

I-TEA® 1

## IMMAGINE GRAPPOLO



## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	nella media varietale
<b>Oidio</b>	nella media varietale

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento / Fioritura / Invaiaitura</b>	Medio (anticipa qualche giorno rispetto alla media varietale)
<b>Maturazione</b>	3°/4° epoca

## COSTITUTORE

C.I.V.V. Ampelos - Vivaio Enotria s.s.

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino colore rosso rubino con riflessi violacei, dotato di maggiore complessità aromatica rispetto alla popolazione e ricco di note speziate sia all'olfatto che al gusto

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio piccolo, semi compatto, di forma cilindrico piramidale con un'ala molto evidente
<b>Fertilità</b>	media
<b>Produttività</b>	medio elevata
<b>Vigoria</b>	un po' più tardivo degli altri biotipi omologati
<b>Acino</b>	sferico, medio piccolo, con buccia consistente pruinosa di colore nero violaceo

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,61
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	4,84
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	28
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	174
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,5
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1,03
<b>Indice di Ravaz</b>	4,7

# Cabernet Franc Nero

I-TEA® 2

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

C.I.V.V. Ampelos - Vivaio Enotria s.s.

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino colore rosso rubino con riflessi violacei, dotato di maggiore complessità aromatica rispetto alla popolazione e ricco di note speziate sia all'olfatto che al gusto

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio, corto, di forma cilindrico piramidale con due ali
<b>Fertilità</b>	inferiore alla media della popolazione
<b>Produttività</b>	inferiore alla media della popolazione
<b>Vigoria</b>	media
<b>Acino</b>	leggermente ovale con buccia consistente pruinosa di colore nero violaceo

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	nella media varietale
<b>Oidio</b>	nella media varietale

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	medio
<b>Fioritura</b>	medio
<b>Invaiaura</b>	medio
<b>Maturazione</b>	4° epoca

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,42
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	4,34
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	27,8
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	154
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,7
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	0,87
<b>Indice di Ravaz</b>	4,9

# Cabernet Franc Nero

I-TEA® 3

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

C.I.V.V. Ampelos - Vivaio Enotria s.s.

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino colore rosso rubino con riflessi violacei, dotato di maggiore complessità aromatica rispetto alla popolazione e ricco di note speziate sia all'olfatto che al gusto.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio, corto, di forma cilindrico piramidale con due ali
<b>Fertilità</b>	inferiore alla media della popolazione
<b>Produttività</b>	inferiore alla media della popolazione
<b>Vigoria</b>	media
<b>Acino</b>	leggermente ovale con buccia consistente pruinosa di colore nero violaceo

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	nella media varietale
<b>Oidio</b>	nella media varietale

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	medio
<b>Fioritura</b>	medio
<b>Invaiatura</b>	medio
<b>Maturazione</b>	4° epoca

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,51
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	4,38
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	30,5
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	143
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,5
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	0,97
<b>Indice di Ravaz</b>	4,8

# Cabernet Franc Nero

I-CRAVIT-ERSA FVG 300

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

CRA -VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura  
di Conegliano (TV)

ERSA- Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
Rurale del Friuli Venezia Giulia

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

A livello aromatico prevalgono le sensazioni di frutti rossi, vegetale e speziato. Il vino si presenta tendenzialmente acido ed astringente, con buon corpo e notevole persistenza. Il vino presenta un corredo aromatico intenso e sufficientemente complesso a cui si unisce un'ottima struttura e persistenza. Per queste sue caratteristiche si presta ad un medio invecchiamento.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	di peso medio leggermente superiore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Fertilità</b>	reale leggermente superiore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Produttività</b>	superiore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Acino</b>	medio-piccolo, sferico, di colore nero bluastrò

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	-
<b>Oidio</b>	-

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	3° decade aprile
<b>Fioritura</b>	2° decade giugno
<b>Invaiaura</b>	2° decade agosto
<b>Maturazione</b>	1° decade ottobre

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,49
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	3,74
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	23,1
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	162
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,63
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1140
<b>Indice di Ravaz</b>	3,28

# Cabernet Franc Nero

I-CRAVIT-ERSA FVG 301

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

CRA -VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (TV)  
ERSA- Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di buona complessità ed intensità aromatica, caratterizzato da note descrittive che spaziano dal fruttato allo speziato. Il vino si presenta di buona struttura e persistenza in bocca, con un ottimo equilibrio tra le varie componenti gustative. Il vino presenta un interessante corredo aromatico unito ad una buona struttura e si distingue soprattutto per possedere un ottimo livello sia di equilibrio che di eleganza. Si può consigliare quindi come clone di base.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio, cilindro conico, semispargolo, talvolta alato
<b>Fertilità</b>	reale superiore
<b>Produttività</b>	superiore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Acino</b>	medio-piccolo, sferico, di colore nero bluaastro

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	-
<b>Oidio</b>	-

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	3° decade aprile
<b>Fioritura</b>	1° decade giugno
<b>Invaiaura</b>	2° decade agosto
<b>Maturazione</b>	1° decade ottobre

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,62
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	3,98
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	25,7
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	155
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,46
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1240
<b>Indice di Ravaz</b>	3,21

# Cabernet Franc Nero

I-CRAVIT-ERSA FVG 302

## IMMAGINE GRAPPOLO



## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	-
<b>Oidio</b>	-

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	2° decade aprile
<b>Fioritura</b>	1° decade giugno
<b>Invaiaura</b>	2° decade agosto
<b>Maturazione</b>	3° decade settembre

## COSTITUTORE

CRA -VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (TV)  
ERSA- Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino che presenta un corredo aromatico importante con sensazioni prevalenti di frutta accompagnate da note speziate, con toni minori di frutta secca e vegetale. In bocca si contraddistingue per un equilibrato livello di astringenza tannica a cui si accompagna una ottima struttura e persistenza. Per queste sue caratteristiche si può considerare un clone miglioratore adatto a produzioni da medio-lungo invecchiamento.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio,-piccolo, cilindro conico, semispargolo, talvolta con piccola ala
<b>Fertilità</b>	reale inferiore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Produttività</b>	minore rispetto al clone di riferimento I-ISV F V4
<b>Acino</b>	medio-piccolo, sferico, di colore nero bluaastro

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,20
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	2,69
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	16,3
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	165
<b>Peso medio acino (g)</b>	1,51
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1040
<b>Indice di Ravaz</b>	2,59