

Ciliegiolo Nero

I-UBA-RA CI 3

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	precoce
Fioritura	precoce
Invaiaura	precoce
Maturazione	precoce

COSTITUTORE

Regione Abruzzo Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo; Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Foggia
Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica, Miglianico (CH).

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino di media intensità, limpido, con riflessi leggermente violacei; Il bouquet è floreale, speziato, con sentori di frutti di bosco, vegetale secco, erbaceo. Al palato i vini si presentano sapidi, di buona struttura e con medi livelli di persistenza, acidità e astringenza.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	medio-grande, forma cilindrico-conica, spesso alato; peduncolo di media lunghezza, di colore verde
Fertilità	media
Produttività	media
Vigoria	media
Acino	di colore blu-nero, molto pruinoso, grande, di forma rotonda

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,24
Produzione per ceppo (kg)	6,5
Numero grappoli/ceppo	18,56
Peso medio grappolo (g)	350
Peso medio acino (g)	3,0
Peso legno potatura (kg/ceppo)	1,36
Indice di Ravaz	4,78