

# Uva di Troia Nero

I-UBA 49/G

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

Università degli studi di Bari

## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

La produzione, nonostante la fertilità delle gemme inferiore alla media, si presenta leggermente superiore a quella della popolazione per le dimensioni del grappolo più elevate. I contenuti zuccherini dell'uva sono risultati con valori medi, l'acidità totale leggermente superiore alla media della popolazione. Si adatta ai diversi sistemi di allevamento e potatura, avendo una buona fertilità basale.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	Grappolo: medio, piramidale, semplice o alato, mediamente compatto
<b>Fertilità</b>	superiore alla media
<b>Produttività</b>	superiore alla media
<b>Vigoria</b>	superiore alla media
<b>Acino</b>	medio, sferoidale, con buccia pruinosa, spessa e consistente, quasi coriacea, con colore dell'epidermide violetto

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	-
<b>Oidio</b>	-

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	tardivo
<b>Fioritura</b>	media
<b>Invaiatura</b>	precoce
<b>Maturazione</b>	tardiva

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,70
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	6,84
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	19
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	363,2
<b>Peso medio acino (g)</b>	3,16
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1,43
<b>Indice di Ravaz</b>	4,78

# Uva di Troia Nero

I-UBA 49/M

## IMMAGINE GRAPPOLO



## COSTITUTORE

Università degli studi di Bari

## DESCRIZIONE ORGANOLETICA

Vino di colore rosso bordeaux, con aroma molto tenue, sapore asciutto, armonico, lievemente astringente, nel complesso gradevole. Complessivamente il clone presenta le caratteristiche di tipicità della varietà ed è enologicamente valido.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

<b>Grappolo</b>	medio, piramidale, semplice o alato, mediamente compatto
<b>Fertilità</b>	media
<b>Produttività</b>	media
<b>Vigoria</b>	media
<b>Acino</b>	medio, sferoidale, con buccia pruinosa, spessa e consistente, quasi coriacea, con colore dell'epidermide violetto

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

<b>Botrite</b>	-
<b>Oidio</b>	-

## FASE FENOLOGICA

<b>Germogliamento</b>	tardivo
<b>Fioritura</b>	media
<b>Invaiatura</b>	tardiva
<b>Maturazione</b>	tardiva

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

<b>Fertilità reale</b>	1,55
<b>Produzione per ceppo (kg)</b>	5,94
<b>Numero grappoli/ceppo</b>	18
<b>Peso medio grappolo (g)</b>	331,7
<b>Peso medio acino (g)</b>	3,49
<b>Peso legno potatura (kg/ceppo)</b>	1,49
<b>Indice di Ravaz</b>	3,98